

Příprava pacienta ke koloskopickému vyšetření přípravkem Picoprep

5 dnů před vyšetřením

- přestaňte používat preparáty obsahující železo (Ferronat, Sorbifer Durules, Aktiferrin) včetně doplňků stravy obsahující železo;
- vysad'te ze stravy potraviny s hrubými zbytky, hlavně zrnka a slupky (rybíz, angrešt, jahody, rozinky, kiwi, melouny, rajčata, citrusy a pečivo s hrubými zrny a mákem).

1 den před vyšetřením

- ráno pouze lehká snídaně;
- během dne je možno podávat pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy);
- nepijte ovocné džusy s dužinou.

V případě, že užíváte klopido-grel (Plavix, Iscover, Trombex) nebo léky zabraňující srážení krve (Pradaxa, Xarelto) či léky ředící krev (Warfarin, Lawarin), salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Stacyl, Godasal), nebo nesteroidní antirevmatika (Brufen, Ibalgin), sdělte to co nejdříve lékařům. Dále ho upozorněte na případné další onemocnění jako je diabetes mellitus (cukrovka), glaukom (zelený zákal), alergie...

Prázdníci přípravek Picoprep

V 16 hodin vypijte první sáček naředěný ve 150ml studené vody. Poté je nutné dostatečně pít – alespoň 2 litry tekutin během 4 hodin. Druhý sáček nařed'te a požíj'te stejným způsobem ve 21 hodin, vypijte opět 2 litry tekutin (dle Vaší chuti a tolerance).

Je-li Vaše vyšetření naplánováno později než v 11 hodin, první sáček nařed'te a vypijte v 18 hodin, druhý sáček nařed'te a vypijte až v den vyšetření v 6 hodin ráno.

V den vyšetření

Čiré tekutiny můžete požívat jen po doušcích. Součástí vyšetření je zpravidla podání léků s tlumivým účinkem. V těchto případech nelze po vyšetření 24 hodin řídit motorová vozidla ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Doporučujeme zajistit si k vyšetření doprovod.

- Před příchodem na naše pracoviště se laskavě zaregistrujte v Infocentru v přízemí Ambulantního pavilonu A Oblastní nemocnice Náchod.
- Vyšetření se provádí na Endoskopickém centru Oblastní nemocnice Náchod, Ambulantní pavilon A, 4. patro, kde vyčkejte v čekárně.
- Datum vyšetření: