Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení gynekologicko - porodnické
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM
PŘEDSÍŇOVÉ, BARTHOLINSKÉ ČI BARTHOLINIHO ŽLÁZY

Vážená paní,
rozhodla jste na základě doporučení Vašeho gynekologa léčit Vaše potíže operačním výkonem, proto je důležité, abyste byla seznámena s následujícím.

Předsíňová žláza, Bartholiniho či **Bartholinská žláza** je párová žláza velikosti hrášku nacházející se v zadní části velkých stydkých pysků na okraji poševního vchodu.
Ze žlázy vede vývod, kterým je vyměšován sekret. Zánět žlázy (bartholinitida) postihující převážně mladší, sexuálně aktivní ženy, vzniká v případě vniknutí mikroorganismů z pochvy do vývodu žlázy. Stěna vývodu žlázy zduří, následkem dojde k uzávěru vývodu, stagnaci obsahu a posléze k jeho zanícení, vzniku abscesu Bartholinské žlázy (ohraničená dutina vyplněná hnisem). Pokud v této fázi onemocnění není zahájena adekvátní léčba, může dojít k šíření zánětu i do okolí a ke vzniku zánětlivé reakce celého organismu.

Projevem **zánětu (abscesu) Bartholinské žlázy** je zhoršující se **bolest v oblasti genitálu, hmatné zduření žlázy a otok**. Žena nemůže sedět, obtížně chodí. V první fázi onemocnění stačí **konzervativní terapie** (klid, obklady, antibiotika, analgetika), pokud se ale onemocnění dál rozvíjí, je nutné **chirurgické řešení**.
Dojde-li k **uzávěru vývodu Bartholinské žlázy bez známek zánětu**, hovoříme o **retenční cystě Bartholinské žlázy**. Její obsah bývá nejčastěji vodnatý či hlenový, nikoli hnisavý. Retenční cysta se projevuje vyklenutím (zpravidla nebolestivým) a zcela chybí známky zánětu (teplota, zarudnutí, bolest).

Lékař zvolil ve Vašem případě tento operační výkon a postup:
VLASTNÍ OPERAČNÍ VÝKON
□ ***Incize (naříznutí) a drenáž***
Je prováděna buď v celkové, nebo lokální anestezii. V místě největšího vyklenutí cysty je proveden řez. Dutina cysty je vypláchnuta příslušným dezinfekčním roztokem a v případě potřeby je rána zajištěná drénem, který je fixován jedním stehem k okraji incize (naříznutí). Drén je ponecháván dle sekrece (vylučování) a jsou prováděny dle potřeby výplachy. Tento způsob ošetření je rychlý a jednoduchý, jeho nevýhodou je však možnost recidivy (opakování se) abscesu (cysty).

□ ***Exstirpace (chirurgické vynětí)***
V takovém případě se v narkóze skalpelem nařízne povrch kůže a následně se celá Bartholinská žláza vypreparuje a vyjme s následnou rekonstrukcí povrchových tkání (podkoží, kůže) několika stehy. Dle potřeby je opět možné vložit drén stejně jako v případě incize.

□ ***Marsupializace(vnější drenáž)***
Je prováděna v celkové anestezii. Principem tohoto zákroku je vypuštění (drenáž) cysty odstraněním (vyříznutím) části její stěny s následným přišitím vnitřku cysty ke kůži a vytvoření otvoru pro drenáž (vypouštění) obsahu. Lékař provede malý řez cca 1cm (incize) do cysty nebo abscesu přímo v poševním vchodu, tím dojde k evakuaci hnisu nebo tekutiny. Nakonec přišije několika stehy vnitřek cysty ke kůži, čímž vytvoří permanentní malý otvor, kterým může být další tekutina vypouštěna ven ze žlázy.

Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení gynekologicko - porodnické
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

VLASTNÍ OPERAČNÍ VÝKON

Operace Bartholiniho žlázy se provádí v celkové anestezii a v gynekologické poloze. Ihned po zákroku budete cítit úlevu.

PO VÝKONU

Je-li pooperační průběh bez komplikací, můžete být v odpoledních hodinách po zákroku propuštěna domů. Na kontrolu ke svému gynekologovi je vhodné se dostavit obvykle za 1–2 týdny, při potížích pochopitelně ihned.

MOŽNÁ RIZIKA A KOMPLIKACE

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žilách), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli.
Nejméně 24h po výkonu provedeném v celkové narkóze platí zákaz činností vyžadujících zvýšenou pozornost (tj. řízení motorových vozidel, obsluha strojů atd.)
Po ambulantním zákroku si zajistěte doprovod domů.

ALTERNATIVA VÝKONU

Alternativy výkonu jsou předmětem tohoto informovaného souhlasu.

Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Primář MUDr. Marek Střecha
Gynekologicko – porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Jméno pacientky: ..... r.č. .....

Vysvětlující pohovor provedl .....
Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace a způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi.
Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Náchodě dne: .....
Podpis pacientky