

Příprava pacienta k enteroskopickému vyšetření

4 dny před vyšetřením

- vynechte tyto léky : preparáty obsahující železo (Ferronat, Sorbifer, FerroFolgamma apod.) léky které snižují motilitu trávicího traktu (spasmolytika, analgetika)

1 den před vyšetřením

- odpoledne již nejzte, dopoledne je možno podávat pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy)
- V případě známek pomalého vyprazdňování trávicí trubice či opakované gastrokopie z důvodu nevyprázdňového žaludku je možno podávat dopoledne pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy)
- s přípravou začněte v **17 hodin**, kdy před vyšetřením vypijete 1 sáček přípravku **Picoprep**. Vypijte první sáček naředěný ve 150ml studené vody. Poté je nutné dostatečně pít – alespoň 2 litry tekutin během 4 hodin.

V den vyšetření

- druhý sáček **Picoprep** nařeďte a požíjte stejným způsobem v **7 hodin**, vypijte opět 2 litry tekutin (dle Vaší chuti a tolerance).
- pít můžete pouze čiré tekutiny
- 4 hod před vyšetřením již nepijte
- součástí vyšetření je i podání léků s tlumivým účinkem. V těchto případech nelze po vyšetření 24 hodin řídit motorová vozidla ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost. **Je nutné zajistit si k vyšetření doprovod.**
- V případě provádění **balonové enteroskopie** jsou nemocní do druhého dne hospitalizováni z důvodů sledování možného podráždění slinivky břišní. V tomto případě se výkon provádí v analgosedaci či celkové anestezii.
- Před příchodem na naše pracoviště se laskavě zaregistrujte v Infocentru Oblastní nemocnice Náchod.
- Vyšetření se provádí na Endoskopickém centru Oblastní nemocnice Náchod, Ambulantní pavilon A, 4.patro, kde vyčkejte v čekárně.
- Datum vyšetření :