

**OBEČNÉ INFORMACE:**

Před vyšetřením si **vezměte své léky**, jak jste zvyklí.

Před vyšetřením **upozorněte personál na**: alergie, těhotenství, užívání léků na cukrovku, onemocnění ledvin a štítné žlázy.

Před vyšetřením **není nutné lačnit** (kromě speciální přípravy na daná vyšetření viz str.2).

CT vyšetření bez aplikace kontrastní látky

Jedná se obvykle o CT vyšetření páteře, kloubů, mozku, vedlejších dutin nosních, HRCT plic.

► Tato vyšetření **nevyžadují žádnou speciální přípravu ani lačnění**.

CT vyšetření s aplikací kontrastní látky

Jedná se o vyšetření CT břicha a pánve, krku, cév (CT angiografie), CT plic.

U **CT břicha** bývá často před vyšetřením podávána tekutina k lepšímu zobrazení střev. Popíjí se 1-1,5 hod. před vyšetřením v CT čekárně. Je potřeba upozornit, že u některých pacientů může po vypití této tekutiny dojít k průjmu.



U pacientů s alergiemi je nutné na tuto skutečnost upozornit dostatečně dopředu, aby mohlo být zváženo využití jiné vyšetřovací metody nebo mohla být provedena příprava léky potlačujícími alergickou reakci.

U pacientů s poškozením ledvin může být nutná příprava infuzemi. O její nutnosti rozhodne lékař podle laboratorních hodnot. O případné nutnosti přípravy před vyšetřením budete informováni.

Vždy je vhodné před CT vyšetřením **dostatečně pít** vodu kvůli omezení rizika poškození ledvin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA NA JEDNOTLIVÁ VYŠETŘENÍ




CT enterografie

► Den před vyšetřením je nutné zavést mírný **dietní režim**, kdy začnete lehkou snídaní. Následuje oběd a večeře s vyloučením masa, mléčných výrobků a potravin obsahujících vlákninu.

► **6 hodin před vyšetřením již nejíst.** Vhodný je dostatek tekutin jako čaj, voda.

Před vlastním vyšetřením budete vyzváni k pití 1,5l roztoku cukru po dobu zhruba 45 minut.



CT kolografie a irrigografie

Pro tato vyšetření je nutné mít co nejméně naplněná střeva, aby střevní obsah neznemožnil hodnocení vyšetření.


► **3 dny před vyšetřením** budete jíst bezsezbytkovou a nenadýmavou stravu, vynecháte ovoce, zeleninu, luštěniny a čerstvé pečivo.

► **1 den před vyšetřením** si dáte již jen lehkou snídani, k obědu ideálně bramborovou kaši a mleté maso. Večeři již vynecháte a do doby vyšetření již nebudete nic jíst.

Od svého ošetřujícího lékaře budete vybaveni projímacím prostředkem, který užijete podle návodu.

► **4 hod. před vyšetřením** již pít jen malá množství obyčejné vody.

U virtuální koloskopie bude během vyšetření aplikován do tlustého střeva vzduch rektální rourkou. V případě irrigografie bude stejným způsobem aplikován roztok kontrastní látky.



Periradikulární terapie pod CT (kořenový obstřík)

V případě, že užíváte **léky na ředění krve**, je potřeba, abyste navštívili svého obvodního lékaře, který vám doporučí buď vysazení těchto léků na kratší dobu před výkonem nebo tyto léky nahradí jinými.

► Protože budete ležet 15–45 minut na břiše, je vhodné **lačnit 3 hod.** před výkonem.

► Doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem. **Po vyšetření** je nutné setrvat cca 30 min. v klidu v čekárně, poté můžete s doprovodem odejít. V den vyšetření je vhodný klidový režim. Není vhodné řídit motorová vozidla.