Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení gynekologicko - porodnické
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM
UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ VE II. TRIMESTRU
(UPT, INTERRUPCE)

Vážená paní,

na doporučení Vašeho gynekologa, které je podloženo výsledky provedených vyšetření, jste se rozhodla ukončit Vaše těhotenství. Je důležité, abyste byla seznámena s postupem, vlastním výkonem, následky a možnými komplikacemi, který tento zákrok s sebou přináší.
Provedení UPT ve druhém trimestru těhotenství (tj. mezi 12. - 24. týdnem těhotenství) je možné dle zákona č. 66/1986 Sb., pouze je-li ohrožen život ženy, v případě prokázaného těžkého poškození plodu nebo je-li plod neschopen života.

PŘED VÝKONEM

Tento výkon vyžaduje hospitalizaci na našem oddělení již den před plánovaným výkonem. Jsou nutná vstupní vyšetření a laboratorní odběry. Následující den se lékař pokusí o vyvolání kontrakcí dělohy. V případě pravidelných kontrakcí již nebudete moci jíst ani pít, aby po vypuzení plodu mohl lékař provést revizi dutiny děložní (vyčištění) v celkové anestezii.

VLASTNÍ POSTUP VÝKONU

- Musíte být hospitalizována na našem oddělení.
- **Na noc** Vám lékař zavede do pochvy tabletu s obsahem prostaglandinů ke změkčení děložního čípku. (Alternativou v přípravě děložního hrdla je zavedení tyčinek Dilapan, které přes noc zvětšují svůj objem a rozšiřují děložní hrdlo. To však porodní cesty jen k výkonu připravují, dále je nutné pokračovat v aplikaci prostaglandinů).
- **Následující den** se za kontroly ultrazvuku zavede přes stěnu břišní ostrá jehla do dutiny děložní. Pomocí této jehly se odebere vzorek plodové vody, která je odesílána na genetické vyšetření a stejným vpichem je poté aplikována do plodového vaku látka s obsahem prostaglandinů, která má vyvolat děložní stahy. (**Alternativou** tohoto výkonu je **opakování zavádění tablet** obsahující prostaglandiny do pochvy a děložního čípku, které způsobují další změkčení a otevírání děložního hrdla a vyvolávají děložní činnosti vedoucí k samotnému potratu plodu, nebo nitrosvalové podání injekcí opět s obsahem prostaglandinů.)
- **Doba trvání** tohoto výkonu je **10-15 minut** a nástup děložních stahů je individuální.

Stahy bývají:

- bolestivé, proto je Vám nabídnuta možnost **epidurální analgezie**, kterou provádí anesteziolog,
- nebo jsou děložní **stahy slabé**. V takovém případě je nutné k jejich zesílení použít infuzi s oxytocinem. Časový interval od aplikace prostaglandinů do potratu je individuální, většinou od 2-24 hodin. Pokud se stahy nevyvolají, je nutné přípravnou fázi ve formě zavádění tablet opakovat.

Tisk: LUSIJA s.r.o., tel.: 499 77 30 30-1, e-mail: lusija@volny.cz

379-2-2020

Nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení gynekologicko - porodnické
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, tel. č. 491 601 744

REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ



Po potratu
Je nutné odstranit zbytky plodového vejce z dutiny děložní. Tento výkon je prováděn v celkové anestezii, kdy lékař provede tzv. **revizi dutiny děložní (vyčištění)** za pomocí kyrety – nástroje, kterým se odstraňují zbytky plodového vejce z dělohy. Plod i s placentou je odesílán k histologickému vyšetření na patologické oddělení, event. na cytogenetické vyšetření do fakultní nemocnice Hradec Králové.

MOŽNÁ RIZIKA A KOMPLIKACE:

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žilách), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli.

DOBA HOSPITALIZACE:

Při nekomplikovaném průběhu trvá 3-4 dny. Pohlavní abstinence a zvýšená hygiena rodidel se doporučuje 14 dní. První menses po výkonu se dostaví za 4-6 týdnů. Další gravidita je doporučována až za půl roku až po ukončení všech nutných vyšetření. Do té doby je doporučováno chránit se antikoncepcí.

ALTERNATIVA VÝKONU

- císařský řez

Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby výkon proběhl bez komplikací.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Primář MUDr. Marek Střecha
Gynekologicko – porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Jméno pacientky: ..... r.č. .....

Vysvětlující pohovor provedl .....
Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace a způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi.
Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Náchodě dne: .....
Podpis pacientky