

PODÁNÍ OCHRANNÝCH PROTILÁTEK PROTI INFEKCI RSV U NOVOROZENCŮ

(Beyfortus © , Sanofi, Česká republika)

Milé maminky, vážení rodiče,

jsme rádi, že Vaším novorozencům můžeme nabídnout podání ochranných protilátek proti tzv. RS (respiračnímu syncytiálnímu) viru, stejně jako na porodnicích v celé ČR. Důvodem je, že RSV způsobuje velmi závažná onemocnění dýchacích cest a plic malých dětí v prvním roce života. Protilátky tomu brání, ale nejedná se o očkování. Imunitě dítěte pomáhají, ale nemění ji.

Podání protilátek injekcí do svalu lze podle Vašeho rozhodnutí provést na porodnici nebo později u ošetřujícího dětského lékaře. Můžete ho také odmítnout.

INFORMACE

RS virus je běžný velmi nakažlivý virus, který způsobí u většiny dětí onemocnění dýchacích cest nejméně jedenkrát do roku věku a téměř u všech do 2 let. Až u jedné třetiny dětí napadá nejmenší průdušky, průdušinky a plic a způsobuje známé závažné nemoci – bronchitidy, bronchiolitidy a zápaly plic. Vyskytuje se převážně v zimních měsících u dětí i dospělých, ale nejvíce jsou ohroženi novorozenci a kojenci.

Podání protilátek znamená tzv. pasivní imunizaci. Dětem může předat protilátky maminka očkovaná v těhotenství, nebo se již hotové biotechnologicky vyrobené protilátky aplikují po narození. Podobný postup se dlouhodobě používá pro nedonošená miminka a děti ve vysokém riziku.

Od podzimu 2025 existuje v České republice možnost podat protilátky proti RS viru i jinak zdravým dětem v jejich první RSvirové sezóně od října do konce března. Na postupu se shodly Česká neonatologická společnost, Česká vakcinologická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii.

Spolu s nimi doporučujeme podání přípravku Beyfortus © všem dětem mladším než 8 měsíců.

PODÁNÍ A BEZPEČNOST

Beyfortus © se aplikuje novorozenci nebo kojenci pouze jedenkrát, ideálně těsně před sezónou výskytu RS virů. Je účinný a bezpečný, proto je plně hrazený zdravotními pojišťovnami pro všechny novorozence a kojence. Je bezpečný při dlouhodobém sledování, závažné nežádoucí účinky nebyly zjištěny. Přípravek byl v běžné praxi podáván novorozencům a kojencům v některých zemích EU již rutinně v minulých sezónách.

DOPORUČENÍ

Beyfortus © doporučujeme všem novorozencům narozeným v měsících říjen až březen před propuštěním z novorozeneckého oddělení. Budou tak proti onemocněním RS viry optimálně chráněny. V případě, že se přípravek Beyfortus © na porodnici nepodá, je doporučena aplikace co nejdříve po propuštění u ošetřujícího praktického dětského lékaře. Pro děti narozené od dubna do září doporučujeme podání až před nadcházející sezónou RS virových onemocnění, nejlépe v říjnu nebo listopadu.

APLIKACE

Přípravek Beyfortus © se aplikuje jedenkrát injekcí do svalu. Nemá žádný důvod, proč neočkovat (nemá specifickou kontraindikaci). Jako u každé jiné injekce je možná bolest v místě vpichu (tu lze bezpečně zmírnit například současným kojením) nebo začervení po vpichu. Závažnou alergickou reakci (tzv. anafylaxi) nelze podobně jako u jiných léků zcela vyloučit, ale tato pravděpodobnost je velmi malá.

Podrobné informace najdete na odkazech:

<https://cneos.cz/rsv/>

<https://www.sanofi.com/cs/ceska-republika/rsv>

<https://vaccination-info.europa.eu/cs/rsv>

MUDr. Ivan Zaikin, zástupce primáře pro novorozenecké oddělení

MUDr. David Neumann, Ph.D., primář oddělení