



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA ANTABUS – ALKOHOLOVÁ REAKCE – AAR

Vážený/a pane/í
na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem doporučena dlouhodobá léčba disulfiramem (Antabusem).

Co je AAR?:

Při pravidelném podávání Antabusu a současném požití alkoholu dochází k AAR. Tato reakce způsobí nepříjemné tělesné a psychické změny, které mohou přimět k přerušení příjmu alkoholu a mohou tak zabránit další pravidelné konzumaci alkoholu.

Při reakci dojde k zčervenání, zarudnutí očních spojivek, bolesti hlavy, dušnosti, k rozkolísání krevního tlaku, nevolnosti, někdy zvracení.

Alternativa: V současné době se neprovádí jiný typ averzivní léčby.

Jak se AAR provádí?:

Při příjmu odevzdáte ošetřujícímu lékaři laboratorní vyšetření a potvrzení od interního lékaře, že jste schopen tuto reakci podstoupit.

Následně Vám bude podáván po 3 dny Antabus v dávkách, které určí lékař.

4. den Vám bude podáno minimální množství alkoholu při pravidelných kontrolách tlaku krve a tepové frekvence lékařem a zdravotní sestrou. Po podání alkoholu dojde k výše popsané reakci.

Jaké jsou možné komplikace a rizika?:

Při podávání Antabusu a současné abstinenci jsou rizika srovnatelná s většinou běžně užívaných léčiv, ojediněle zahrnují alergické kožní reakce, ospalost, nevolnost.

Pokud dojde k požití malého množství alkoholu, jsou změny v organismu spíše subjektivně nepříjemné, než nebezpečné. Vyšší konzumace alkoholu však může vést k závažným, někdy nevratným poruchám v činnosti organizmu, které v krajním případě mohou končit smrtí.

Prohlašuji, že mi byl náležitě a srozumitelně objasněn důvod, prospěch, způsob provedení a možná rizika a komplikace plánovaného výkonu a s výkonem souhlasím.

Jméno pacienta(ky): r.č.

Vysvětlující pohovor provedl

Razítka a podpis lékaře

V Novém Městě nad Metují dne:

Podpis pacienta(ky)