

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PUNKCÍ NEBO DRENÁŽÍ POD KONTROLOU ZOBRAZOVACÍCH METOD

Osobní údaje pacienta

Jméno a příjmení pacienta: Zdravotní pojišťovna:

Rodné číslo: Váha (kg):

Adresa: Telefon:

Zákonný zástupce:

..... (jméno a příjmení, datum narození, příbuzenský vztah)

Zdravotní údaje pacienta

Diagnóza slovy: Číselný kód dg.:

Anamnéza (alergie na lokální anestetika, stav hemokoagulace, léky na ředění krve):

.....

.....

Odesílající lékař:

Vyšetřující radiolog:

Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu

Vášim ošetřujícím lékařem vám byl navržen léčebný výkon punkce nebo drenáž k odstranění nežádoucí tekutiny ve vašem těle. Obvykle se jedná o nahromadění hnisu nebo krve v dutině nebo dutinovém orgánu.

Vysvětlení výkonu a možné alternativy

Punkce znamená, že za CT nebo ultrazvukové kontroly je jehlou napíchnuta dutina nebo dutinový orgán v těle obsahující nežádoucí tekutinu. Jehlou je pak možno odsát obsah dutiny nebo dutinového orgánu.

Drenáž znamená, že místo jehly je po tzv. vodiči (tenký drátek) zaveden do dutiny měkký drén (hadička) tak, aby obsah dutiny mohl sám vytékat ven. Drén se ponechává tak dlouho, dokud se obsah dutiny zcela nevyprázdní. U dutinových orgánů (např. močových nebo žlučových cest) se ponechává tak dlouho, jak je potřeba vzhledem k celkovému stavu nemocného. Drény je možno i po několika týdnech či měsících vyměňovat. Vyšetření se provádí v místním znecitlivění.

Alternativou tohoto výkonu může být konzervativní léčba antibiotiky, která však nemusí být pro potlačení nemoci dostačující nebo pak otevřený chirurgický výkon, kdy se operativně dutina nařízne a vyčistí v celkové anestezii. Punkce/drenáž jsou méně invazivní než chirurgické řešení a účinnější než řešení konzervativní.

Režim před výkonem

K výkonu je vhodné být nalačno. V případě, že užíváte léky na ředění krve, je potřeba, abyste navštívili svého obvodního lékaře, který vám doporučí buď vysazení těchto léků na kratší dobu před výkonem nebo tyto léky nahradí jinými. V některých případech, kdy je napichovaná dutina uložena v nepříznivém místě, může být před výkonem indikována analgetická příprava k potlačení bolesti, a to po poradě s ošetřujícím lékařem.

Postup během výkonu

Při vyšetření budete polohován tak, aby byl přístup do punktované/drénované oblasti co nejsnazší. Po zacílení místa zájmu pomocí CT nebo UZ a označení, Vám bude po dezinfekci kůže provedeno místní znecitlivnění místa vpichu. Poté Vám bude do příslušného místa zavedena jehla/drén a po kontrole polohy bude tekutina odsáta nebo napojena na sběrný sáček. Po výkonu bude místo vpichu překryto sterilním krytím. V případě drenáže, bude drén navíc fixován ke kůži.

Režim po výkonu

Po výkonu vás doprovodný personál převezme zpět na oddělení, kde budete pravidelně kontrolováni. Po výkonu byste měli ležet v klidu na lůžku. V případě větších bolestí, krvácení či jiných potíží ihned informujte svého ošetřujícího lékaře.

Rizika a komplikace

Bolesti v místě vpichu jsou obvykle mírné. K jejich potlačení můžete požádat ošetřující personál o léky na bolest. Krvácení v místě vpichu nebývá obvyklé a pokud nastane je řešeno ošetřujícím personálem. Z dalších komplikací může dojít k vytržení drénu, proto je vhodné dodržovat klidový režim. Další specifická rizika podle místa vpichu, vám vysvětlí výkon provádějící radiolog. Může dojít k alergii na látku užívanou k místnímu znecitlivnění, nejčastěji ve formě kožní reakce. Upozorněte proto před vyšetřením na Vaše alergie (zejména lékové). Léčba spočívá v podání léků na snížení alergické reakce.

Souhlasné prohlášení

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedeným plánovaným výkonem. Byl(a) jsem lékařem informován(a) o možnosti výskytu nežádoucích účinků spojených s tímto výkonem.

Svým podpisem níže potvrzujete:

1. že jste četl(a) poučení a souhlasíte s výše uvedeným prohlášením;
2. že výše léčebný výkon Vám byl srozumitelně vysvětlen Vaším ošetřujícím lékařem a dostal(a) jste všechny informace, které jste požadoval(a) a že dáváte oprávnění a souhlas k vykonání výše uvedeného léčebného výkonu a k případným nutným následným vedlejším zásahům, které se ukáží během tohoto výkonu nebo v návaznosti na něj nezbytnými či prospěšnými.

V Trutnově dne

Podpis pacienta/zákonného zástupce:

Jméno a podpis ošetřujícího lékaře:

Nemůže-li se pacient(ka) podepsat:

Jména (tiskacím/razítko), podpisy svědků:

.....

Zdůvodnění: